



Handleiding module Doelmatig Voorschrijven 2018 Zorg en Zekerheid

Inhoud

1. De prescriptiemodule 2017 in grote lijnen	4
2. Deelname aan de prescriptiemodule: de praktische kanten	7
2.1. Verantwoording	7
2.2. De indicatoren uit de prescriptiemodule	8
2.3. Deelname op FTO-groepsniveau of als huisarts(en)praktijk	8
2.4. Genereren uitkomsten en noemergrootte uit Vektisdatabestand voor individuele huisartsen. 9	
2.5. Samenvoegen van uitkomsten van meerdere huisartsen.....	10
2.6. Berekenen van de somscore	10
2.7. Wat te doen bij veranderen van huisartspraktijk of stoppen met praktiseren in 2017.	12
3. De indicatoren: definitie en operationalisatie	13
3.1. Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica.....	14
3.2. Voorkeursmiddelen cholesterolverlagende middelen.....	15
3.3. Behandeling diabetespatiënten met metformine – alle gebruikers	16
3.4. Voorkeursmiddelen protonpompremmers	17
3.5. Voorkeursmiddelen NSAID's – generieke voorkeursmiddelen.....	18
3.6. Generieke indicator Eerste uitgiftes.....	19
4. Veelgestelde vragen.....	20
4.1. Inleiding	20
4.2. Waarom kan ik pas vanaf half maart 2018 over de cijfers van heel 2017 beschikken?	20
4.3. Hoe weet Vektis welke patiënt bij welke huisarts hoort?	21
4.4. Kunnen apothekhoudende huisartsen meedoen aan de prescriptiemodule?	21
4.5. Wat is een nieuwe gebruiker?	21
4.6. Hoe valide en betrouwbaar zijn de indicatoren?	21
4.7. Zijn de indicatoren ook betrouwbaar wanneer ik maar weinig patiënten heb?.....	22
4.8. Wat is de invloed van een afwijkende patiëntenpopulatie?	22
4.9. Wat is de invloed van de specialist op de indicatoren?	22
4.10. Hoe komt het dat ik me niet herken in de cijfers?	22
4.11. Waarom haal ik de gewenste score op een indicator niet terwijl ik in 2017 een interventie heb uitgevoerd?	23
4.12. Wat is de invloed van weekafleveringen op de indicatorscores?	23
4.13. Kan ik inzien op welke patiënten de cijfers zijn gebaseerd?.....	23
4.14. Komen de scores en patiëntenlijsten van de SFK Benchmark Voorschrijven overeen met de cijfers van de MVH?	23
Bijlagen	24
1 Vektis-webrapportage	24
2 Excelsheet 'Scores huisartsengroep handmatig samenvoegen 2017'.....	25
3 Excelsheet 'Berekening ZZ somscore 2017 Doelmatig voorschrijven', verantwoordingsformulier	
26	

Inleiding

In 2018 kunt u als huisarts(en)praktijk of als FTO-groep deelnemen aan de module Doelmatig Voorschrijven van Zorg en Zekerheid. De indicatoren worden net als in de prescriptiemodule 2017 berekend op basis van declaratiegegevens uit de Vektisdatabase. Om deze reden kunnen in 2018 net als in 2017 alle huisartsen deelnemen aan de module. Dus ook apotheekhoudende huisartsen, huisartsen waarvan de patiënten naar een groot aantal apotheken gaan en huisartsen waarvan patiënten naar apotheken gaan die geen cijfers aanleveren aan SFK. Vektis is een landelijke database waarin declaratiegegevens van de zorgverzekeraars - geanonimiseerd - worden verzameld.

In het volgende hoofdstuk wordt de prescriptiemodule in grote lijnen besproken. De 6 indicatoren die door Zorg en Zekerheid zijn geselecteerd staan hier op een rij alsmede een aantal belangrijke aandachtspunten. In hoofdstuk 2 staan een aantal punten uit hoofdstuk 1 meer gedetailleerd beschreven. In dit hoofdstuk kunt u ook lezen hoe u zich moet verantwoorden naar Zorg en Zekerheid en hoe u de nulmeting uitvoert. Vervolgens geven we in hoofdstuk 3 een uitgebreide beschrijving van achtergrond en definitie van de 6 indicatoren. Ten slotte vindt u in hoofdstuk 4 antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

1. De prescriptiemodule 2018 in grote lijnen

De module Doelmatig Voorschrijven is net als in 2017 gebaseerd op de prescriptie-indicatoren die het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontwikkeld heeft ten behoeve van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (tot 1-1-2012 Benchmark Voorschrijven Huisartsen genaamd).

De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen bevat ongeveer 30 indicatoren, waarvan Zorg en Zekerheid er 6 heeft geselecteerd voor de module Doelmatig Voorschrijven 2018.

<i>Thema</i>	<i>Indicatornaam</i>	<i>Nummer</i>	<i>Type</i>
Antibiotica	Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica	1	Voorkeursmiddelen
CVRM	Voorkeursbehandeling cholesterolverlagende middelen – nieuwe gebruikers	11A	Voorkeursmiddelen
Diabetes	Behandeling diabetespatiënten met metformine – alle gebruikers	17A	Voorkeursmiddelen
Maag	Voorkeursmiddelen protonpompremmers	20B	Voorkeursmiddelen
COPD	Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie bij astma en COPD - nieuwe gebruikers	(n.t.b.)	Voorkeursmiddelen
	Generieke indicator Eerste uitgiftes	GI3	Doelmatigheid

Somscore

De beloning van de module is gekoppeld aan de somscore van de 6 indicatoren. Per indicator kunt u afhankelijk van de uitkomst op de indicator 0, 1, 2 of 3 punten scoren. Voor de indicatoren geldt hoe hoger de uitkomst op de indicator, hoe beter u scoort op deze indicator. De scores op alle indicatoren worden bij elkaar opgeteld tot de somscore. Deze bedraagt minimaal 0 en maximaal 18 punten.

Deelname als FTO-groep of praktijk

Zorg en Zekerheid biedt in 2018 de module Doelmatig Voorschrijven aan op huisarts(en)praktijkniveau of op FTO-groepsniveau. Bij beloning op FTO-groepsniveau hangt de beloning af van de gezamenlijke somscore van alle huisartsen van de FTO-groep. Bij beloning op huisarts(en)praktijkniveau hangt de beloning af van de gezamenlijke somscore van alle huisartsen van de praktijk. Deelname als individuele huisarts binnen een groeps- of duo praktijk is niet mogelijk, omdat deze huisartsen meestal zo nauw met elkaar samenwerken dat de individuele scores niet te bepalen zijn. Alleen huisartsen met een solopraktijk kunnen dus individueel deelnemen aan de prescriptiemodule.

Indien u als deelnemer van een GKF-groep mee doet aan de module Doelmatig Voorschrijven 2018, wordt uw score op GKF-niveau berekend.

Noemer en nulmeting

Aan beide opties zitten voor- en nadelen. Het grote voordeel om als huisarts(en)praktijk deel te nemen is dat de beloning gekoppeld is aan uw eigen prestaties of dat van uw directe collega's. Een groot nadeel bij met name kleine praktijken is dat het aantal patiënten waarop indicatoren wordt berekend kleiner is waardoor de indicatoren niet of minder betrouwbaar te meten zijn. Bij patiënten aantallen kleiner dan 20 zijn de uitkomsten op de indicatoren weinig betrouwbaar en speelt toeval een relatief grote rol. Dit kan zowel in uw voor- als in uw nadeel werken. Zorg en Zekerheid heeft besloten niet te corrigeren voor indicatoren die vanwege kleine patiënten aantallen weinig betrouwbaar te meten zijn.

Aan het belonen op FTO-groepsniveau zit een aantal voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat de indicatoren betrouwbaarder te meten zijn. Het aantal patiënten waarop de indicatoren berekend wordt is veel groter. Verder ondersteunt beloning op FTO-niveau het functioneren van het FTO. Het FTO kan gebruikt worden om interventies uit te voeren waarmee scores op indicatoren kunnen worden verbeterd. Opgemerkt moet wel worden dat het effect van interventies op scores van indicatoren vaak wel gelijk zichtbaar is maar in het algemeen pas na 12 maanden maximaal is. Een nadeel van belonen op FTO-groepsniveau is dat de beloning afhangt van de gezamenlijke somscore van alle huisartsen uit de groep.

Het is aan te raden om voordat u zich inschrijft een nulmeting te doen. U moet zowel kijken naar de uitkomsten op de indicatoren als naar het aantal patiënten waarop de diverse indicatoren zijn gebaseerd. Dit geeft u inzicht in uw verbeterpotentieel en ook in de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de indicatoren. Ook een nulmeting op FTO-niveau is aan te raden. Zie hoofdstuk 2 voor een instructie voor het uitvoeren van een nulmeting. U kunt in het FTO de scores op de indicatoren bespreken. Uiteindelijk moet u besluiten of en hoe u in 2018 gaat deelnemen aan de prescriptiemodule. Kiest u voor deelname als FTO-groep of als huisarts(en)praktijk, dan geldt als eis dat alle huisartsen van het samenwerkingsverband op deze wijze meedoen.

Overige praktische zaken

Voor **15 mei 2019** moet u uiterlijk¹ de behaalde somscore op de indicatoren over heel 2018 rapporteren aan Zorg en Zekerheid.

Wij adviseren u de handleiding begin 2018 goed te bestuderen zodat u weet welke eisen Zorg en Zekerheid aan u in 2018 stelt in deze module. Verder vragen wij u de handleiding begin 2019 goed door te lezen alvorens het verantwoordingsformulier 2018 in te vullen, zie bijlage 3. U kunt het verantwoordingsformulier medio 2018 vinden op www.zorgenzekerheid.nl/huisartsen, onder het kopje 'Farmaciebeleid en FTO', onder de naam 'Berekening ZZ somscore 2018 Doelmatig voorschrijven'.

Samenvattend

- Deelname is mogelijk als huisarts(en)praktijk of als FTO-groep.
- Alle huisartsen in het Zorg en Zekerheid gebied kunnen meedoen aan de prescriptiemodule.
- Verantwoording op basis van Vektisdata.
- Belonen aan de hand van somscore van 6 indicatoren.
- Gradaties in scores (4 kwartielen) op indicatoren.
- Geen correctie voor indicatoren die gebaseerd zijn op te kleine aantallen.
- Het maximale effect van een interventie op de score van de indicator is in het algemeen pas na 12 maanden volledig zichtbaar.

¹ Indien blijkt dat de Vektisgegevens op 1 april 2019 nog niet (volledig) beschikbaar zijn, zal Zorg en Zekerheid een nieuwe inleverdatum vaststellen en die tijdig naar u communiceren.

2. Deelname aan de prescriptiemodule: de praktische kanten

In dit hoofdstuk vindt u uitgebreide informatie over deelname aan de prescriptiemodule. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Aanmelding en verantwoording in paragraaf 2.1.
- De indicatoren uit de prescriptiemodule in paragraaf 2.2.
- Deelname als huisarts(en)praktijk of als FTO-groep in paragraaf 2.3.
- Genereren van uitkomsten en noemers uit het Vektisdatabestand in paragraaf 2.4.
- Samenvoegen van uitkomsten op indicatoren van meerdere huisartsen in paragraaf 2.5.
- Berekening van de somscore in paragraaf 2.6.
- Wat te doen bij veranderen van huisartspraktijk of stoppen met praktiseren in 2018 in paragraaf 2.7.

2.1. Verantwoording

Over 2018 moet u uiterlijk op **15 mei 2019** de behaalde somscore op de indicatoren die *heel 2018* beslaan rapporteren aan Zorg en Zekerheid. Deze gegevens kunt u **vanaf half april 2019**² halen uit de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen op mvh.zorgprisma.nl bij het overzicht 'Indicatorscores per jaar' (zie paragraaf 2.4 tot en met 2.6).

Voor de verantwoording dient u digitaal bij Zorg en Zekerheid aan te leveren via fto.huisartsen@zorgenzekerheid.nl:

- het verantwoordingsformulier zoals opgenomen in bijlage 3. Dit formulier kunt u medio 2018 downloaden van www.zorgenzekerheid.nl/huisartsen, onder het kopje 'Farmaciebeleid en FTO', onder de naam 'Berekenen ZZ somscore 2017 Doelmatig voorschrijven'.
- per huisarts of per huisartsengroep de uitkomsten op de indicatoren (overzicht 'Indicatorscores per jaar' uit de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen op mvh.zorgprisma.nl).
- indien u meedoet met meerdere huisartsen en geen gebruik maakt van de dienst groepenbeheer van Vecozo: de ingevulde spreadsheet waarmee u de indicatorscores heeft bepaald, zie bijlage 2.

² Indien blijkt dat de Vektisgegevens op 1 april 2019 nog niet (volledig) beschikbaar zijn, zal Zorg en Zekerheid een nieuwe inleverdatum vaststellen en die tijdig naar u communiceren.

2.2. De indicatoren uit de prescriptiemodule

In deze tabel vindt u een overzicht van de indicatoren uit de prescriptiemodule. Om praktische redenen is er voor gekozen om ze in dezelfde volgorde te plaatsen als waarin ze in de Vektiswebrapportage (zorgprisma) staan.

<i>Nummer</i>	<i>Indicatornaam</i>
1	Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica
11A	Voorkeursbehandeling cholesterolverlagende middelen – alle gebruikers
17A	Behandeling diabetespatiënten met metformine – alle gebruikers
20B	Voorkeursmiddelen protonpompremmers
(n.t.b.)	Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie bij astma en COPD - nieuwe gebruikers
GI3	Generieke indicator Eerste uitgiftes

2.3. Deelname op FTO-groepsniveau of als huisarts(en)praktijk

Deelname aan de prescriptiemodule is mogelijk op FTO-groepsniveau, maar ook op huisarts(en)praktijkniveau. Hierbij geldt dat deelname als individuele huisarts binnen een groeps- of duo praktijk in 2018 niet is toegestaan. De reden hiervoor is dat deze huisartsen meestal zo nauw met elkaar samenwerken dat de individuele scores niet te bepalen zijn. Alleen huisartsen met een solopraktijk kunnen dus individueel deelnemen aan de prescriptiemodule.

Voordelen van deelname met de FTO-groep

- De indicatoren zijn door grotere patiënten aantallen betrouwbaarder te meten.
- Het FTO kan gebruikt worden voor gezamenlijke interventies op zwak scorende indicatoren.

Risico van deelname met de FTO-groep

- De beloning hangt af van de gezamenlijke somscore van alle huisartsen uit de groep.

Voordeel van deelname als huisarts(en)praktijk

- De beloning is geheel gekoppeld aan uw eigen prestaties en/of dat van uw directe collega's.

Risico van deelname als huisarts(en)praktijk

- De kans dat een aantal indicatoren vanwege te kleine aantallen patiënten weinig betrouwbaar te meten is, is groot. Dit speelt met name bij patiënten aantallen kleiner dan 20. Toeval speelt dan een relatief grote rol. Dit kan zowel in uw voor- als in uw nadeel werken. Zorg en Zekerheid heeft besloten niet te corrigeren voor indicatoren die vanwege kleine patiënten aantallen weinig betrouwbaar te meten zijn. Verricht een nulmeting om dit risico in te schatten.

Het is belangrijk om met bovenstaande voordelen en risico's rekening te houden bij de keuze of u als lid van een FTO-groep of als huisarts(en)praktijk deelneemt aan de module.

Als u als FTO-groep deelneemt aan de module dan moeten alle leden van het FTO kiezen voor deelname op FTO-groepsniveau. Het is dus niet mogelijk dat de ene helft van de FTO-groep kiest voor belonen op huisarts(en)praktijkniveau of niet meedoet aan de module en de andere helft kiest voor belonen op FTO-groepsniveau.

2.4. Genereren uitkomsten en noemergrootte uit Vektisdatabestand voor individuele huisartsen

Huisartsen kunnen hun scores op de indicatoren van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen inzien op de website mvh.zorgprisma.nl. Deze website is door Vektis in samenwerking met het IVM ontwikkeld.

Huisartsen kunnen inloggen op de monitor met behulp van een Vecozo-certificaat of een UZI-pas. Dit is ook nodig om via Vecozo te declareren.

Instructie voor het maken van een overzicht van de scores van de indicatoren inclusief omvang noemers

- Ga via **Internet Explorer** naar de website mvh.zorgprisma.nl. U wordt automatisch geleid naar het Vecozoportaal.
- Meldt u in het Vecozoportaal aan.
- Als de aanmelding is gelukt dan kunt u de prescriptie-indicatoren bekijken. Lukt het inloggen niet dan kunt u contact opnemen met Vektis: mvh@zorgprisma.nl. Ook kunt u hier terecht voor vragen over de bediening van de monitor.
- Lees indien u onbekend bent met de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen eerst de gebruikershandleiding of bekijk het instructiefilmpje.
- Ga naar het overzicht 'Indicatorscores per jaar'.
- Selecteer bij de keuzemogelijkheid - 'Selecteer het jaar' - het meest recente jaar.
- Selecteer bij de keuzemogelijkheid - 'Selecteer één of meer indicatoren' - de acht indicatoren uit de prescriptiemodule.
- Selecteer bij de keuzemogelijkheid - 'Selecteer actuele of vorige versie' - de juiste versie. U vindt aanwijzingen hiervoor in hoofdstuk 3.
- Klik op voltooiën.
- Print het rapport uit door er eerst een pdf van te maken. Dit doet u via het icoon rechtsboven in het scherm  .
- In de eerste twee kolommen na de namen van de indicatoren kunt u lezen hoe u op de

indicatoren gescoord heeft en hoe groot de noemers zijn. Dit zijn de kolommen met titels 'gemiddelde score huisarts' en 'noemer huisarts', allebei zonder toevoeging van de naam van de geselecteerde zorgverzekeraar.

- Vul niet de 'gemiddelde score' en 'referentiewaarde' in; dit zijn de landelijke gegevens ter vergelijking van uw score.

2.5. Samenvoegen van uitkomsten van meerdere huisartsen

De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen op mvh.zorgprisma.nl heeft sinds juli 2013 een functionaliteit om uitkomsten op indicatoren van huisartsen bij elkaar op te tellen. Dit is de dienst Groepenbeheer MVH, die u via de website van Vecozo kunt benaderen. U kunt lid zijn van verschillende groepen, bijvoorbeeld binnen de praktijk en de FTO-groep. Zie voor meer informatie <https://www.vecozo.nl/diensten/mvh/kennisbank.aspx>

U kunt ook handmatig de uitkomsten van de individuele huisartsen optellen om te komen tot de uitkomst van een FTO-groep respectievelijk duo- of groepspraktijk. Dit optellen moet gebeuren via de methodiek voor het berekenen van een gewogen gemiddelde.

Instructie voor het berekenen van een gewogen gemiddelde:

Gebruik hiervoor gegevens uit het overzicht 'Indicatorscores per jaar'.

Elke huisarts moet op basis van zijn AGB-code de gegevens genereren en uitprinten.

- Zoek de uitkomst van de indicator van huisarts 1 (Ind1) op.
- Zoek de noemer bij huisarts 1 (N1) op.
- Zoek de uitkomst van de indicator bij huisarts 2 (Ind2) op.
- Zoek de noemer bij huisarts 2 (N2) op.
- (etc. voor eventuele andere artsen)
- Bereken het gewogen gemiddelde:
 - o $(\text{Ind1} * \text{N1} + \text{Ind2} * \text{N2} + \dots) / (\text{N1} + \text{N2} + \dots)$.

Het IVM heeft een hulpmiddel - een excelsheet - ontworpen waarmee u eenvoudig de noemers en de uitkomsten op de indicatoren van uw samenwerkingsverband kunt bepalen (zie bijlage 2). U kunt de excelsheet downloaden van www.zorgenzekerheid.nl/huisartsen onder het kopje 'Farmaciebeleid en FTO'.

2.6. Berekenen van de somscore

De somscore van de 6 indicatoren wordt als volgt berekend. Afhankelijk van uw score op de indicator kunt u 0, 1, 2 of 3 punten halen. Deze punten bij elkaar opgeteld vormen uw somscore waarop uw beloning wordt gebaseerd. De somscore zal variëren tussen 0 en 18

met een gemiddelde van 9. In de tabel staan per indicator de uitkomsten op de indicatoren en de scores die daar bij horen.

Het toekennen van het aantal punten voor een uitkomst op een indicator is gebaseerd op landelijke cijfers over 2015 van Vektis. De landelijke scores worden verdeeld in kwartielen. Valt uw score in het eerste kwartiel, waaronder de scores van de 25 procent slechtst scorende huisartsen vallen, dan krijgt u 0 punten voor de indicator. Valt uw score daarentegen in het vierde kwartiel, waaronder dus de 25 procent best scorende huisartsen vallen, dan krijgt u 3 punten op de indicator. In de tabel staan per indicator de kwartielen vermeld en het daarbij behorende aantal punten. Let op de volgorde van de indicatoren; deze kunnen verschillen van hoe ze in de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen in Zorgprisma staan.

Nummer	Indicatornaam	Score			
		0	1	2	3
1	Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica	≥18,6%	14,8-18,5%	12,0-14,7%	≤11,9%
11A	Voorkeursbehandeling cholesterolverlagende middelen - nieuwe gebruikers	≤70,6%	70,7-74,8%	75,8%-84,6%	≥84,7%
17A	Behandeling diabetespatiënten met metformine - alle gebruikers	≤87%	88-90%	91-92%	≥93%
20B	Voorkeursmiddelen protonpompremmers	≤78%	79-84%	85-89%	≥90%
(n.t.b.)	Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie bij astma en COPD - nieuwe gebruikers	(n.t.b.)	(n.t.b.)	(n.t.b.)	(n.t.b.)
GI3	Generieke indicator Eerste uitgiftes	≤72%	73-75%	76-77%	≥78%

Het IVM heeft een hulpmiddel - een excelsheet - ontworpen waarmee u eenvoudig de somscore kunt berekenen (zie bijlage 3). U kunt deze spreadsheet medio 2018 downloaden van www.zorgzekerheid.nl/huisartsen, onder het kopje 'Farmaciebeleid en FTO'. Als u uw behaalde score per indicator in de sheet invult wordt automatisch uw score berekend. Belangrijk is dat u alleen maar het getal invult, zonder "%".

Let op!

Als u als FTO-groep of als groepspraktijk mee doet moet u eerst de uitkomsten op de indicatoren van de individuele huisartsen samenvoegen, zie paragraaf 2.5. Vervolgens bepaalt u met bovengenoemd hulpmiddel de somscore van het samenwerkingsverband.

2.7. Wat te doen bij veranderen van huisartspraktijk of stoppen met praktiseren in 2018

Verandering van huisartspraktijk in 2018

Als u in een andere huisartspraktijk gaat werken, heeft dit in principe geen gevolgen voor uw deelname aan de prescriptiemodule. Uw AGB-code, via welke u inlogt op de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen op mvh.zorgprisma.nl, is gekoppeld aan u als huisarts en niet aan de plaats waar u praktijk houdt. Bij verandering van werkkring neemt u dus de AGB-code mee. Het is daarmee dus ook niet mogelijk om in de webrapportage onderscheid te maken in de indicatorscores voor- en na verhuizing. Als u begin 2018 heeft aangegeven dat u meedoet aan de prescriptiemodule en u wilt in aanmerking komen voor de beloning dan moet u over 2018 conform de in deze handleiding beschreven wijze verantwoording afleggen aan Zorg en Zekerheid.

Stoppen met praktiseren in 2018

Als u in 2018 stopt als huisarts, maar u heeft zich begin 2018 wel aangemeld voor de prescriptiemodule dan kunt u als u wilt toch in aanmerking komen voor de beloning. U moet dan over 2018 conform de in deze handleiding beschreven wijze verantwoording afleggen aan Zorg en Zekerheid. Opgemerkt moet wel worden dat door het stoppen de noemers van de indicatoren lager zullen worden. Hierdoor worden de uitkomsten op de indicatoren minder betrouwbaar.

In beide situaties geldt dat Zorg en Zekerheid de beloning enerzijds zal baseren op de behaalde somscore en anderzijds op het aantal maanden dat u werkzaam bent geweest in het gebied waar Zorg en Zekerheid de preferente zorgverzekeraar is.

3. De indicatoren: definitie en operationalisatie

In deze tabel vindt u een overzicht van de indicatoren uit de prescriptiemodule. Om praktische redenen is er voor gekozen om ze in dezelfde volgorde te plaatsen als waarin ze in zorgprisma staan. In de paragrafen hieronder staan de indicatoren nader toegelicht.

<i>Nummer indicator</i>	<i>Indicatornaam</i>	<i>Type</i>	<i>Thema</i>	<i>Paragraaf</i>
1	Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica	Voorkeursmiddelen	Antibiotica	3.1
11A	Voorkeursbehandeling cholesterolverlagende middelen – nieuwe gebruikers	Voorkeursmiddelen	CVRM	3.2
17A	Behandeling diabetespatiënten met metformine – alle gebruikers	Voorkeursmiddelen	Diabetes	3.3
20B	Voorkeursmiddelen protonpompremmers	Voorkeursmiddelen	Maag	3.4
(n.t.b.)	Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie bij astma en COPD - nieuwe gebruikers	Voorkeursmiddelen	COPD	3.5
GI3	Generieke indicator Eerste uitgiftes	Doelmatigheid		3.6

3.1. Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica

Nummer: 1

Deze indicator brengt in kaart welk percentage van alle antibioticumvoorschriften van de huisarts een recept is voor een reserve-antibioticum. Een lagere score dan gemiddeld betekent dat de huisarts minder vaak een reserve-antibioticum (chinolonen, cefalosporines, amoxicilline met clavulaanzuur) voorschrijft.

Achtergrond:

Chinolonen, cefalosporinen en amoxicilline/clavulaanzuur zijn volgens de NHG-Standaarden Urineweginfecties (2013), Otitis media acuta bij kinderen (2014), Acute keelpijn (2015), Acut hoesten (2013), Acute rhinosinusitis (2014), COPD (2015), Bacteriële huidinfecties (2007) en het Farmacotherapeutisch Kompas in de meeste situaties geen eerste keuze middelen. Chinolonen en cefalosporinen zijn zogenaamde 'reserve' antibiotica. Over amoxicilline met clavulaanzuur staat in het Kompas: amoxicilline met clavulaanzuur dient men alleen toe te passen bij infecties door micro-organismen, waarvan de resistentie tegen amoxicilline aangetoond of aannemelijk is. De indruk bestaat dat men amoxicilline-clavulaanzuur te veel onnodig voorschrijft. Om de mogelijke ontwikkeling van resistentie te voorkomen dienen al deze middelen terughoudend te worden voorgeschreven.

Er zijn enkele indicaties waarbij reservemiddelen wel als eerste keus worden aangeraden. Deze komen echter veel minder vaak voor dan infecties waarbij met de eerstekeusantibiotica kan worden uitgekomen. Reserve-antibiotica hebben ook een plaats bij het falen van een eerstekeusantibioticum. Daarom worden alle antibioticumvoorschriften binnen 20 dagen na een eerder antibioticumvoorschrift uitgesloten.

Definitie:

$$\frac{\text{Aantal voorschriften van chinolonen, cefalosporines en amoxicilline/clavulaanzuur}}{\text{Aantal voorschriften antibiotica}}$$

Operationalisatie:

Teller: Alle voorschriften van J01CR02 (amoxicilline met clavulaanzuur), J01D (cefalosporines) en J01M (chinolonen)
Noemer: Alle voorschriften van J01 (antibiotica)
Populatie: Alle patiënten
Toewijzing aan: Voorschrijver van het antibioticumvoorschrift
Uitsluiten: Voorschriften waarbij maximaal 20 dagen daarvoor, een ander middel J01 (antibiotica) is afgeleverd

3.2. Voorkeursmiddelen cholesterolverlagende middelen – nieuwe gebruikers

Nummer: 11A

Deze indicator kijkt naar alle gebruikers van cholesterolverlagende middelen. Een hogere score dan gemiddeld betekent dat de huisarts vaker kiest voor simvastatine in plaats van een ander cholesterolverlagend middel

Achtergrond

Wanneer een patiënt voor het eerst een cholesterolverlagend middel gaat gebruiken gaat volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (2012) de voorkeur uit naar simvastatine. Bij het niet behalen van de streefwaarden kan atorvastatine of rosuvastatine worden voorgeschreven. De prijs van atorvastatine ligt anno 2016 veel lager dan de prijs van rosuvastatine en is hiermee een doelmatiger keuze.

De getoonde jaarnoemer komt niet overeen met het aantal unieke gebruikers van cholesterolverlagende middelen in de praktijk, maar is de som van de noemers van vier kwartalen.

Definitie

Aantal nieuwe gebruikers van simvastatine of atorvastatine

Aantal nieuwe gebruikers van cholesterolverlagers

Operationalisatie

Teller: Nieuwe gebruikers van C10 (cholesterolverlagers) met als laatste voorschrift C10AA01 (simvastatine) of C10AA05 (atorvastatine)

Noemer: Nieuwe gebruikers van C10 (cholesterolverlagers)

Populatie: Nieuwe patiënten

Toewijzing aan: Voorschrijver van het laatste voorschrift voor cholesterolverlagers

3.3. Behandeling diabetespatiënten met metformine – alle gebruikers

Nummer: 17A

Deze indicator kijkt naar alle gebruikers van bloedglucoseverlagende middelen exclusief insuline. Een hogere score dan gemiddeld betekent dat meer patiënten die bloedglucoseverlagende middelen gebruiken, ook metformine gebruiken, al dan niet in combinatie met andere middelen.

Achtergrond

Volgens de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2013) is in geval van medicamenteuze behandeling metformine het orale bloedglucoseverlagende middel van eerste keuze. Als daarmee de streefwaarde niet wordt bereikt, is het advies om een sulfonylureumderivaat toe te voegen aan de metformine.

De getoonde jaarnoemer komt niet overeen met het aantal unieke gebruikers van bloedglucoseverlagende middelen in de praktijk, maar is de som van de noemers van vier kwartalen.

Definitie

Aantal gebruikers van metformine en combinaties met metformine

Aantal gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen

Operationalisatie

Teller: Aantal gebruikers van A10BA02 (metformine) en A10BD02, A10BD03, A10BD05, A10BD07, A10BD08 (combinaties met metformine)

Noemer: Aantal gebruikers van A10B (orale bloedglucoseverlagende middelen)

Populatie: Alle patiënten

Toewijzing aan: Voorschrijver van het laatste voorschrift bloedglucoseverlagende middelen

3.4. Voorkeursmiddelen protonpompremmers

Nummer: 20A

Deze indicator kijkt naar alle gebruikers van protonpompremmers. Een hogere score dan gemiddeld betekent dat de huisarts vaker kiest voor generieke versies van omeprazol of pantoprazol.

Achtergrond

De NHG-Standaard Maagklachten (2013) geeft aan dat er geen belangrijke verschillen in effectiviteit zijn tussen de protonpompremmers. Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas behoort bij de keuze van een protonpompremmer, gezien de geringe onderlinge verschillen, de prijs een belangrijke rol te spelen. Omeprazol is de goedkoopste protonpompremmer. Wanneer een patiënt met een indicatie voor maagbescherming ook clopidogrel gebruikt, kan pantoprazol gekozen worden.

Sinds 1 januari 2012 worden protonpompremmers alleen nog bij chronisch gebruik vergoed. Alleen voorschriften voor chronische gebruikers van protonpompremmers worden in deze indicator gemeten. De getoonde jaarnoemer komt niet overeen met het aantal unieke gebruikers van protonpompremmers in de praktijk, maar is de som van de noemers van vier kwartalen.

Definitie

$$\frac{\text{Aantal gebruikers van generiek omeprazol en pantoprazol}}{\text{Aantal gebruikers van protonpompremmers}}$$

Operationalisatie

Teller:	Alle gebruikers van A02BC01 (omeprazol) en A02BC02 (pantoprazol) met generiek inkoopkanaal
Noemer:	Alle gebruikers van A02BC (protonpompremmers), M01AE52 (naproxen met esomeprazol) en B01AC56 (acetylsalicylzuur met esomeprazol)
Populatie:	Alle patiënten
Toewijzing aan:	Voorschrijver van het laatste voorschrift protonpompremmers

3.5. Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie bij astma en COPD - nieuwe gebruikers

Nummer: n.t.b.

Definitie

Aantal nieuwe gebruikers van R03AC (LABA), R03BA (ICS), R03BB (LAMA) als monotherapie

Aantal nieuwe gebruikers van R03AC (LABA), R03AK (LABA+ICS), R03AL (LABA+LAMA),
R03BA (ICS), R03BB (LAMA)

3.6. Generieke indicator Eerste uitgiftes

Nummer: GI3

Achtergrond:

Deze indicator laat zien in hoeverre de huisarts generieke middelen voorschrijft binnen geneesmiddelgroepen waar generieke middelen en metoopenpreparaten beschikbaar zijn. De indicator wordt berekend over de nieuwe voorschriften van de huisarts. Dit zijn alle voorschriften waar de apotheek een eerste-uitgiftetarief in rekening brengt.

Definitie: Voorschriften eerste uitgiftes multisource
Totaal aantal voorschriften eerste uitgiftes

Operationalisatie:

Teller: Aantal eerste voorschriften die bepaald zijn voor de noemer en met een inkoopkanaal 2 of 4.

Noemer: Aantal eerste multi source of me too voorschriften (WMG-code is 7, 10, 19, 22, 31, 34, 43, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 94) met een geldig Z-index nummer.

Populatie: alle patiënten

Meetperiode: 1 jaar

4. Veelgestelde vragen

4.1. Inleiding

In de gebruikershandleiding en de rubriek 'Veelgestelde vragen over indicatoren en applicatie' van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen op mvh.zorgprisma.nl kunt u op een groot aantal algemene vragen betreffende de Monitor een antwoord vinden. De 'Veelgestelde vragen' in dit hoofdstuk richten zich met name op vragen die nauw samenhangen met het belonen van huisartsen voor goed voorschrijven aan de hand van prescriptie-indicatoren uit de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen.

Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden in bovengenoemde bronnen, kunt u contact opnemen met Zorg en Zekerheid, Vektis of het IVM volgens onderstaand kader.

- Zorg en Zekerheid voor vragen over de opzet van de prescriptiemodule en de administratieve afhandeling: fto.huisartsen@zorgenzekerheid.nl.
- Vektis voor technische vragen rond inloggen en bediening monitor: mvh@zorgprisma.nl.
- IVM voor inhoudelijke vragen rond de definities van prescriptie-indicatoren, de uitkomsten en het gebruik in het FTO: monitor@medicijngebruik.nl.

4.2. Waarom kan ik pas vanaf half maart 2019 over de cijfers van heel 2018 beschikken?

Apothekers leveren in principe maandelijks hun declaratiegegevens aan de zorgverzekeraar, die ze weer doorstuurt naar Vektis. Vervolgens kan Vektis de indicatoren berekenen. Vektis streeft er naar dat aan het einde van een kwartaal de indicatoren over het voorgaande kwartaal zijn berekend. Het is wel mogelijk dat nog niet alle zorgverzekeraars alle data van dit voorgaande kwartaal hebben aangeleverd. Bij elke berekening worden alleen die patiënten meegenomen waarvan de zorgverzekeraar het hele kwartaal haar data heeft aangeleverd. Vektis heeft al laten zien dat de scores hierdoor niet wezenlijk verschillen. De noemer kan wel lager zijn. Na een half jaar hebben alle zorgverzekeraars alle data aangeleverd. De score van het betreffende kwartaal kan dan licht afwijken van de score die eerst werd getoond.

Voorbeeld Aan het eind van het 1^e kwartaal van 2019, komen de cijfers van het laatste kwartaal van 2018 beschikbaar. Als een zorgverzekeraar dit laatste kwartaal nog niet volledig heeft aangeleverd, worden die patiënten niet meegenomen in de berekeningen. 3 maanden later, dus uiterlijk eind juni 2019, komt het eerste kwartaal van 2019 beschikbaar, alsmede de update van het laatste kwartaal van 2018. Als voor een huisarts geldt, dat een van de zorgverzekeraars de data over het laatste kwartaal 2018 niet compleet heeft aangeleverd, zal de update op dit moment volledig zijn.

4.3. Hoe weet Vektis welke patiënt bij welke huisarts hoort?

Bij indicatoren gebaseerd op nieuwe gebruikers (voorkeursmiddelen/dosering nieuwe gebruikers):
Bij deze indicatoren kent Vektis de patiënt toe aan de huisarts die de voorschrijver is van het eerste voorschrift.

Bij indicatoren gebaseerd op alle gebruikers (voorkeursmiddelen/dosering alle gebruikers):
Bij deze indicatoren kent Vektis de patiënt toe aan de huisarts die de voorschrijver is van het laatste voorschrift van het geneesmiddel.

Bij de overige indicatoren kent Vektis de patiënt toe aan de huisarts van inschrijving. Indien de huisarts van inschrijving onbekend is, wordt gekeken naar welke huisarts de meeste voorschriften (ongeacht het geneesmiddel) heeft uitgeschreven in het afgelopen jaar. Indien meerdere artsen aan dat criterium voldoen, neemt Vektis de code van de huisarts die het meest recent een geneesmiddel heeft voorgeschreven. Hierbij kan het in incidentele gevallen voorkomen dat de gegevens van een patiënt niet bij zijn eigen huisarts worden gepresenteerd.

4.4. Kunnen apothekhoudende huisartsen meedoen aan de prescriptiemodule?

Ja, alle huisartsen inclusief apothekhoudende huisartsen kunnen meedoen aan de prescriptiemodule.

4.5. Wat is een nieuwe gebruiker?

De term 'nieuwe gebruiker' betekent dat de patiënt voor het eerst een geneesmiddel uit een bepaalde farmacotherapeutische groep (ATC3- of ATC4-niveau) gebruikt. Een nieuwe gebruiker wordt gedefinieerd als een patiënt die een eerste voorschrift krijgt en in de daaraan voorafgaande 12 maanden geen enkel middel uit dezelfde geneesmiddelgroep heeft gekregen. Nieuwe gebruikers waarbij de medicatie gestart is door de specialist worden buiten de indicator gelaten.

4.6. Hoe valide en betrouwbaar zijn de indicatoren?

De indicatoren zijn uitgebreid gevalideerd op inhoud, meetbaarheid en constructvaliditeit. Voor de inhoudsvalidatie hebben experts beoordeeld of de indicatoren een goede weerspiegeling zijn van de richtlijn. Voor het toetsen van de meetbaarheid zijn de indicatoren getoetst op apothekgegevens. Hierbij is vooral gelet op betrouwbaarheid (is de noemer voldoende groot) en op discriminerend vermogen (maakt de indicator onderscheid tussen huisartsen). De constructvaliditeit is getoetst aan de hand van gegevens uit het HIS zoals verzameld door het LINH. Hierbij is onderzocht of de indicator ook daadwerkelijk meet wat hij beoogt te meten, door de uitkomst van de indicator op basis van de apothekgegevens te vergelijken met huisartsgegevens waarbij ook de indicatie voor het voorschrift bekend is. In de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen op mvh.zorgprisma.nl kunt u op de eerste pagina – onder helpdesk - > de validatie van de indicatoren - lezen welke validaties er zijn uitgevoerd.

4.7. Zijn de indicatoren ook betrouwbaar wanneer ik maar weinig patiënten heb?

De aantallen waarop de indicatoren zijn gebaseerd moeten voldoende groot zijn. Dit is vanaf 20 tot 30 patiënten het geval. Dit omdat bij kleine aantallen het toeval een (te grote) rol kan gaan spelen in de uitkomsten op de indicatoren. Dit toeval kan zowel in uw voor- als in uw nadeel zijn. Zorg en Zekerheid corrigeert hier achteraf niet voor. Om zo min mogelijk last te hebben van toeval biedt Zorg en Zekerheid u de module ook aan op FTO-groepsniveau. Hierdoor zal het aantal patiënten waarop de indicatoren berekend worden in het algemeen voldoende groot zijn.

4.8. Wat is de invloed van een afwijkende patiëntenpopulatie?

Afwijkende patiëntpopulaties zijn in principe geen reden om af te wijken van richtlijnen. Toch heeft het IVM bij de ontwikkeling van de indicatoren zoveel mogelijk gecontroleerd en voorzorgen genomen dat de uitkomsten op de indicatoren weinig tot niet afhankelijk zijn van de patiëntenpopulatie van de huisarts. Desondanks kan het voorkomen dat bij sterk afwijkende patiëntenpopulaties sommige indicatoren minder betrouwbaar te meten zijn. Dit kan het geval zijn als veel van uw patiënten in een instelling verblijven, u een hele jonge praktijk heeft of als de zorg in uw verzorgingsgebied sterk afwijkt van hetgeen landelijk gangbaar is. Bijvoorbeeld in uw verzorgingsgebied worden hartvaatziektenpatiënten zeer intensief gestimuleerd hun leefstijl (o.a. voeding, bewegen) aan te passen (in plaats van een statine voor te schrijven). De vereiste score op de indicator Behandeling hartvaatziekten met statines kan daardoor moeilijker te halen zijn.

4.9. Wat is de invloed van de specialist op de indicatoren?

Waar mogelijk corrigeren we voor de invloed van specialistenreceptuur. Bij indicatoren gebaseerd op nieuwe gebruikers zijn gebruikers waarbij de medicatie gestart wordt door de specialist buiten de indicator gelaten. Bij indicatoren die gebaseerd zijn op 'alle gebruikers' zijn patiënten die meer dan de helft van hun voorschriften van de specialist krijgen buiten de indicator gehouden. Toch kan de specialist alsnog invloed hebben op de indicator. In het geval dat de huisarts de herhaalreceptuur voortzet die door de specialist is gestart, en meer dan de helft van de voorschriften op naam van de huisarts staan, telt dit mee in de indicatoren die gebaseerd zijn op 'alle gebruikers'. In dat geval valt het voorschrift onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. De huisarts zou, indien nodig, de behandeling aan kunnen passen. Wanneer de patiënt nog onder behandeling is van de specialist en de huisarts enkel de herhaalreceptuur verzorgt, is afstemming met de specialist over de behandeling wellicht nodig.

4.10. Hoe komt het dat ik me niet herken in de cijfers?

o Het aantal patiënten/voorschriften waarop de indicator is gebaseerd is kleiner dan verwacht. Dit is meestal het resultaat van het uitsluiten van bepaalde patiënten. Dit kan gebeuren doordat de indicator betrekking heeft op een bepaalde leeftijdscategorie of wanneer patiënten meer dan de helft van hun voorschriften van een specialist voorgeschreven krijgen. Ook kan het aantal patiënten kleiner zijn dan verwacht omdat bij het voorschrijven respectievelijk vastleggen van de medicatie gebruik gemaakt wordt van meerdere AGB-codes (AGB-code huisarts en AGB-code

praktijk. Via de methodiek beschreven in paragraaf 2.5 kunt u de prescriptiegegevens van meerdere AGB-codes optellen.

o De specialist heeft toch invloed heeft op de uitkomst van de indicator. Dit kan bij enkele indicatoren voorkomen wanneer een huisarts zelf wel volgens de richtlijnen voorschrijft, maar specialistenreceptuur niet omzet wanneer dit volgens de (NHG-)standaarden wel zou moeten kunnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de indicator Voorkeursmiddelen protonpompremmers (alle gebruikers).

Tip: als u zich niet herkent in de uitkomsten op de indicatoren, dan kunt u overwegen om met behulp van het HIS of met hulp van de apotheker een uitdraai te maken van de desbetreffende patiëntengroep.

4.11. Waarom haal ik de gewenste score op een indicator niet terwijl ik in 2018 een interventie heb uitgevoerd?

In het algemeen geldt dat de gewenste score op een indicator alleen goed te halen is als op de indicator in heel 2018 goed gescoord is. Er is dus geen ruimte om enkele maanden van zwak scoren te compenseren door een aantal maanden van zeer goed scoren. De uitgevoerde interventie kan wel effect hebben op de beloning over de periode daarna.

4.12. Wat is de invloed van weekafleveringen op de indicatorscores?

Het verstrekken van geneesmiddelen in weekdozen, Baxterrollen ed. heeft geen invloed. Dit komt omdat de indicatoren in principe worden berekend op aantallen gebruikers en niet op aantallen voorschriften. Verder is bij de indicatoren die wel op aantallen voorschriften zijn gebaseerd de indicator zo geoperationaliseerd dat hij niet beïnvloed wordt door weekafleveringen. Een voorbeeld hiervan is de indicator 'Reservemiddelen en tweede keus antibiotica.'

4.13. Kan ik inzien op welke patiënten de cijfers zijn gebaseerd?

Nee, dat kan niet. U kunt wel uw apotheker(s) vragen gegevens in de SFK Benchmark


Voorschrijven op te zoeken. Sinds de zomer van 2013 sluiten de definities van de SFK Benchmark Voorschrijven in de meeste gevallen redelijk tot goed aan bij de definities van de MVH. Via de SFK Benchmark Voorschrijven kan de apotheker patiëntenlijsten uitdraaien. De apotheker moet hiervoor wel een abonnement afsluiten. Het gaat om een combi-abonnement Patiëntenzorg en indicatoren.

4.14. Komen de scores en patiëntenlijsten van de SFK Benchmark Voorschrijven overeen met de cijfers van de MVH?

Nee, de scores en patiëntenlijsten komen niet volledig overeen. De mate van overeenkomst is afhankelijk van het type indicator. De scores bij SFK zijn gebaseerd op alle apotheekafleveringen, niet alleen op de gedeclareerde aflevering zoals bij de MVH. Bij SFK kunnen patiënten niet over meerdere apotheken gevolgd worden. Vanwege deze verschillen komen de scores van de BV en de MVH niet voor 100 procent overeen. Ook kunnen patiënten soms wel in de MVH, maar niet in de SFK Benchmark Voorschrijven opgenomen zijn, of andersom.

Bijlagen

1 Vektis-webrapportage



2 Excelsheet 'Scores huisartsengroep handmatig samenvoegen 2018'

De excelsheet is te downloaden van www.zorgzekerheid.nl/huisartsen (onder kopje "Farmaciebeleid en FTO").

Hieronder een voorbeeld hoe de Excel eruit ziet:

Samenvoegen uitkomsten en noemers meerdere huisartsen			
Indicator 1 Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica			
	naam huisarts	score	noemer
ha 1			
ha 2			
ha 3			
ha 4			
ha 5			
ha 6			
ha 7			
ha 8			
ha 9			
ha 10			
ha 11			
ha 12			
ha 13			
ha 14			
ha 15			
Score huisartsengroep			#DEEL/0!
Noemer huisartsengroep			0

3 Excelsheet 'Berekening ZZ somscore 2018 Doelmatig voorschrijven', verantwoordingsformulier

De excelsheet is medio 2018 te downloaden van www.zorgzekerheid.nl/huisartsen (onder kopje "Farmaciebeleid en FTO").

Hieronder ter illustratie hoe de Excel er voor 2017 uit zag (let op: zal in 2018 anders zijn):

Berekening somscore						
Naam indicator	1-1-2017 t/m 31-12-17	Score				Resultaat
	Uitkomst (Vektis invullen zonder: (%))	0	1	2	3	0-3
Reservemiddelen en 2e keusmiddelen antibiotica		≤11,9%	12,0-14,7%	14,8-18,5%	≥18,6	0
Behandeling HVZ-patienten met een statine		≤67	68-71	72-75	≥76	0
Voorkeursmiddelen cholesterolverlagende middelen - alle gebruikers		≤49	50-56	57-62	≥63	0
Behandeling diabetespatiënten met metformine – alle gebruikers		≤87	88-90	91-92	≥93	0
Voorkeursmiddelen NSAID's – generieke voorkeursmiddelen		≤82	83-91	92-96	≥97	0
Voorkeursmiddelen protonpompremmers - alle gebruikers		≤78	79-84	85-89	≥90	0
Generieke indicator Eerste uitgiftes		≤72	73-75	76-77	≥78	0
* Bij deze indicator geldt: hoe lager de score, hoe meer punten u scoort, zie ook paragraaf 4.6 van de handleiding						
Somscore	0					

Uit uw score op bovenstaande prestatie-indicatoren volgt de volgende beloning:

0- 8 punten € 0,00
 9-10 punten € 0,75
 11-12 punten € 1,25
 13-14 punten € 1,75
 15-16 punten € 2,25
 17-18 punten € 2,80

Maximaal € 2,80